

化学療法レジメン

レジメン名

【血】ダウノルビシン+シタラビン(寛解導入)(1クール目)

上限：1クール

レジメンの概要

高リスク急性骨髄性白血病

投与量設定

ビキセオス(ダウノルビシン・シタラビン リポソーム製剤) 100ユニット(ダウノルビシン/シタラビンとして44mg/100mg)/m²(Day1,3,5)

診療科名

血液

投与開始4-6時間前

ラスブリカーゼ3.0-6.0mg/body(TLS予防)

管理コード

200180

インターバル日数

14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 3	...	Day 5				
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○		○				
2	点滴静注	時間：30分			アカリ点静注235mg	1瓶	○								
					パロノトロン点静注パグ0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間：1時間30分	フィルター不可 注射用水の欄:total量を記載 1瓶を注射用水19mLで溶解 溶解後総量20mL	●	ビキセオス配合静注用	44mg/m ²	○		○		○				
					注射用水(100mL)	1瓶	積算値チェック								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									