

化学療法レジメン

レジメン名【消】パニツムマブ+ソトラシブ

レジメンの概要がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

投与量設定(点滴)ﾊﾞｸﾃｲﾍﾞｯｸｽ(ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ) 6mg/kg(day1)

診療科名消化器投与量設定(内服)ﾙﾏｸﾗｽ(ｼﾄﾗｼﾌﾞ) 960mg/day(連日)

管理コード100071インターバル日数14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14						
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 1時間	全量100mLに調製 フィルターライン使用	●	ﾊﾞｸﾃｲﾍﾞｯｸｽ注 生理食塩液（希釈用）	6mg/kg 1瓶	○								
	内服	時間： _____		●	ﾙﾏｸﾗｽ	960mg/day	○	...	○						