

化学療法レジメン

レジメン名		【消】5-FU+I-LV	
レジメンの概要		胃癌、大腸癌	
診療科名	消化器	投与量設定	レボリナト 200mg/m ² (day1)、フルオウラシル 400mg/m ² (bolus)(day1)、2400mg/m ² (46hr)(day1-2)
管理コード	100020	インターバル日数	14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	CVポート	時間： _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	CVポート	時間： 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
3	CVポート	時間： 2時間			レボリナト注	200mg/m ²	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋									
4	CVポート	時間： 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
5	CVポート	時間： 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²	○								
					生理食塩液（希釈用）	1瓶									