

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ペムブロリズマブ+PEM+CBDCA

上限：4クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫

診療科名 呼吸器 投与量設定 キイトルダ（ペムブロリズマブ） 200mg/body(day1)、ハ°メレセト° 500mg/m²(day1)、加味°アラチン AUC=3～5,投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

管理コード 250200 インターバル日数 21 （Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1										
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○										
2	点滴静注	時間： 30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ 注	200mg/body	○										
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶											
3	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○	4クール施行後 【呼】ペムブロリズマブ+PEM(250201) へ移行									
4	点滴静注	時間： 30分			デキサート注射液6.6mg	0.5瓶	○										
					アロカス点滴静注235m g	1瓶											
5	点滴静注	時間： 10分	全量100mLに調製	●	ハ°メレセト° 注	500mg/m ²	○										
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶											
6	点滴静注	時間： 1時間		●	加味°アラチン注	AUC=3～5	○										
					大塚糖液5%(250mLソフトバック)	1袋											