

化学療法レジメン

レジメン名 【不】PTX+CBDCA

レジメンの概要 原発不明癌

診療科名 原発不明 投与量設定 $\text{H}^{\circ}\text{クワタセル } 200\text{mg}/\text{m}^2(\text{day1})$ 、 $\text{カル\"{P}ラチン } \text{AUC}=4\sim6$,投与量= $\text{AUC}\times(25+\text{GFR})$ (day1)

管理コード 550001 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分			デキスト注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					アモキシシン注射用20mg	1管									
					ホ\"{P}ラミン注5mg	2管									
					アカリ点静注235m g	1瓶									
					パ\"{P}ロセト点静注パ\"{P}ック0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間： 3時間	フィルターライン使用	●	パ\"{P}クワタセル注	200mg/m ²	○								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									
4	点滴静注	時間： 1時間		●	カル\"{P}ラチン注	AUC=4~6	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトパ\"{P}ック)	1袋									