

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ+VRD(1クール目)

レジメンの概要 多発性骨髄腫に対する導入、救援療法

投与量設定(点滴) サークリサ(イサツキシマブ) 20mg/kg(day1,8,15,22)、ホルテゾミブ 1.3mg/m²(day1,8,15)、

投与量設定(内服) レブラミト (レナリトミド) 5-25mg/day(day1-21)、レテデックス(デキセメタゾン) 20mg/day(day1,8,15,22)、

診療科名 血液

加ナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1,8,15,22)、ホララミン(d-クルフェニラミン酸塩) 2mg/day(day1,8,15,22)

管理コード 200206

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 21	Day 22	
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★レテデックス,加ナール,ホララミン内服 (サークリサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○		○			○	
2	側管静注	時間: _____	サークリサ投与30分前		リル・コナテ注射用100mg	1瓶	○		○		○			○	
3	点滴静注	時間: <u>3時間20分</u>	全量250mLに調製 フィルターライン使用 0-60分: 25mL/h 60分以降: 30分ごとに25mL/hずつ増量可 ※最大150mL/hまで	●	サークリサ注 生理食塩液 (希釈用)	10mg/kg 1袋	○								
		時間: <u>1時間53分</u>	0-30分: 50mL/h 30-60分: 100mL/h 60分以降: 200mL/h						○						
		時間: <u>1時間15分</u>	200mL/hで投与								○			○	
4	皮下注射	時間: _____	1Vにつき生食1.2mLで 溶解(残破棄) 生食の欄:total量を記載	●	ホルテゾミブ注 生食液NS 20mL	1.3mg/m ² 1管	○		○		○				
	内服	時間: _____		●	レブラミト	5-25mg/day	○	...	...	...	...	...	○		
	内服	時間: _____			レテデックス	20mg/day	○		○		○			○	
	内服	時間: _____			加ナール ホララミン	500mg/day 2mg/day	○		○		○			○	