

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+DEX(1クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(注射) カイ°ロリス(カルフィルゾミブ) 20mg/m²(day1,2)56mg/m²(day8,9,15,16)、ダラキムマブ(ダラツムマブ、ホリルアルロニダーゼα アルファ) 1瓶(day1,8,15,22)

投与量設定(内服) レテックス(デキサメタゾン) 20mg/day(day1,2,8,9,15,16)40mg/day(day22)、メトロール(メチルプレドニゾン) 20mg/day(day3)、

カロナール(アセトアミノフェン) 500mg/day(day1,8,15,22)、ホ°ラミン(d-グルクフェニラミン塩酸塩) 2mg/day(day1,8,15,22)、モンテルカスト10mg/day(day1,8,15,22)

診療科名 血液
管理コード 200090

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	...	Day 8	Day 9	...	Day 15	Day 16	...	Day 22
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★レテックス, カロナール, ホ°ラミン, モンテルカスト内服 (カイ°ロリス及びダラキムマブ投与 1 時間前までに)★		ブドウ糖液5%(100mL)	1袋	○	○			○	○		○	○		
2	側管静注	時間 : _____			リル・コチド注射用100mg	1瓶	○				○			○			
3	点滴静注	時間 : 30分	全量100mLに調製 注射用水の欄:total量を記載	●	カイ°ロリス注 注射用水(100mL) ブドウ糖液5% (希釈用)	20mg/m ² 1瓶 1瓶	○	○									
4	点滴静注	時間 : 30分	全量100mLに調製 注射用水の欄:total量を記載	●	カイ°ロリス注 注射用水(100mL) ブドウ糖液5% (希釈用)	56mg/m ² 1瓶 1瓶					○	○		○	○		
5	皮下注射	時間 : _____	★レテックス, カロナール, ホ°ラミン, モンテルカスト内服 (ダラキムマブ投与 1 時間前までに)★ 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3～5分かけて投与	●	ダラキムマブ注	1瓶	○				○			○			○
	内服	時間 : _____			レテックス	20mg/day	○	○			○	○		○	○		
	内服	時間 : _____			レテックス	40mg/day											○
	内服	時間 : _____			メトロール	20mg/day			○								
	内服	時間 : _____			カロナール ホ°ラミン モンテルカスト	500mg/day 2mg/day 10mg/day	○				○			○			○