

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ペムプロリズマブ+トラスツズマブ+CapeOX(1クール目)

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の胃癌（HER2陽性、CPS陽性）

投与量設定(注射) キイトル-ダ (ペムプロリズマブ) 200mg/body(day1)、トラスツズマブ 8mg/kg(day1)、オキサリプラチン 130mg/m²(day1)

診療科名 消化器 投与量設定(内服) ゼロ-ダ (カペシタシン) 1000mg/m²/回 1日2回(day1-14) ※ゼロ-ダ：通常、day1夕～day15朝

管理コード 100240 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14							
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間：30分	フィルターライン使用	●	キイトル-ダ 注 生理食塩液PL「フー」 50mL	200mg/body 1瓶	○									
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間：1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注 注射用水(100mL) 大塚生食注(250mL袋)	8mg/kg 1瓶 1袋	○									
5	点滴静注	時間：15分			デキサト注射液6.6mg グラセト点静注バグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○									
6	点滴静注	時間：2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注 ブドウ糖液5%（希釈用）	130mg/m ² 1袋	○									
	内服	時間：_____		●	ゼロ-ダ	1000mg/m ² /回 1日2回	○	...	○							

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ゼロ-ダ】

C法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1回用量
1.36㎡未満	1,200mg
1.36㎡以上1.66㎡未満	1,500mg
1.66㎡以上1.96㎡未満	1,800mg
1.96㎡以上	2,100mg