

化学療法レジメン

レジメン名 【血】エブコリタマブ《2ステップ漸増》(1クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫,高悪性度B細胞リンパ腫,原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫),
再発又は難治性の濾胞性リンパ腫(Grade3B)

投与量設定 (注射) I^g キリ(I^g コリタマブ) 0.16mg/body(day1)0.8mg/body(day8)48mg/body(day15,22)、
デキサート(デキサメタゾン) 16.5mg/body(day1-4,8-11,15-18,22-25)

投与量設定 (内服) カナール(アトアミノフェン) 650-1000mg/day(day1,8,15,22)、ホ[®] ラミン(d-グルク[®]エニミン[®]レイン酸塩)2mg/day(day1,8,15,22)
※CRS軽減策としてエブキリ投与前24時間に降圧薬の中断を考慮する。(1クール目のみ)

診療科名 血液
管理コード 200170

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2-4	...	Day 8	Day 9-11	...	Day 15	Day 16-18	...	Day22	Day23-25
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール,ホ [®] ラミン内服 (I ^g キリ投与30-120分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○		○	○		○	○		○	○
2	点滴静注	時間 : 15分			デキサート注射液6.6mg 生理食塩液PL「フー」50mL	2.5瓶 1瓶	○	○		○	○		○	○		○	○
3	点滴静注	時間 : 30分			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○			○			○			○	
4	皮下注射	時間 : _____	※調製手順①を参照	●	I ^g キリ注 生理食塩液	0.16mg/body 0.968mL	○										
5	皮下注射	時間 : _____	※調製手順②を参照	●	I ^g キリ注 生理食塩液	0.8mg/body 0.85mL				○							
6	皮下注射	時間 : _____		●	I ^g キリ注	48mg/body							○			○	
	内服	時間 : _____			カナール ホ [®] ラミン	650-1000mg/day 2mg/day	○			○			○			○	

地方独立行政法人 新小山市民病院

※調整手順①
4mg/バイアルより0.8mLを生食4.2mLで希釈し0.8mg/mLの溶液とする
その溶液2.0mLを生食8.0mLで更に希釈し0.16mg/mLの溶液とする
そこから1.0mLを採液する

※調整手順②
4mg/バイアルより0.8mLを生食4.2mLで希釈し0.8mg/mLの溶液とする
そこから1.0mLを採液する

初回の48mg投与後48時間(通常Day15以降3日間)は
必ず入院管理とすること