

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ブレンツキシマブ ベドチン+CHP

上限：8クール

レジメンの概要 CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫

投与量設定(点滴) トキリビシン 50mg/m²(day1)、インドキサ(シホスファミド) 750mg/m²(day1)、アドセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day1)

診療科名 血液 投与量設定(内服) プレドニ 100mg/day(day1-5)、加ナール(アセアミノフィン) 500mg/day(day1)、ホアラミン(d-グルフェニラミン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200117 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 5							
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★加ナール,ホアラミン内服 (アドセトリス投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1袋	○									
2	点滴静注	時間：15分			パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50mL	1袋	○									
3	点滴静注	時間：30分	積算値チェック	●	トキリビシン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶	○									
4	点滴静注	時間：2時間		●	インドキサ注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋	○									
5	点滴静注	時間：30分	1Vにつき注射用水10.5mLで溶解 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:5mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	アドセトリス注 注射用水(100mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.8mg/kg 1瓶 1瓶	○									
	内服	時間：_____			プレドニ	100mg/day	○	...	○							
	内服	時間：_____			加ナール ホアラミン	500mg/day 2mg/day	○									