

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ+VRD(13-18クール目)

レジメンの概要 多発性骨髄腫に対する導入、救援療法

投与量設定(点滴) サークリサ(イサツキシマブ) 10mg/kg(day1)、ホルテゾミブ 1.3mg/m²(day1,15)

診療科名 血液

投与量設定(内服) レバラミド(レナリドミド) 5-25mg/day(day1-21)、加ナール(アセトアミノフェン) 500mg/day(day1)、ホララミン(d-カルノエラミン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200208

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 15	...	Day 21				
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★加ナール,ホララミン内服 (サークリサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	側管静注	時間 : _____	サークリサ投与30分前		リル・コテフ注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間 : <u>1時間15分</u>	全量250mLに調製 フィルターライン使用 200mL/h	●	サークリサ注 生理食塩液 (希釈用)	10mg/kg 1袋	○								
4	皮下注射	時間 : _____	1Vにつき生食1.2mLで 溶解(残破棄) 生食の欄:total量を記載	●	ホルテゾミブ注 生食液NS 20mL	1.3mg/m ² 1管	○		○						
	内服	時間 : _____		●	レバラミド	5-25mg/day	○	...	...	...	○				
	内服	時間 : _____			加ナール ホララミン	500mg/day 2mg/day	○								

地方独立行政法人 新小山市民病院