

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ベバシズマブ+5-FU+I-LV

レジメンの概要 大腸癌

診療科名 消化器

投与量設定 ベバシズマブ 5mg/kg(day1)、 レボリナート 200mg/m²(day1)、 フルオウラシル 400mg/m²(bolus)(day1)、2400mg/m²(46hr)(day1-2)

管理コード 100025

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート	時間： _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート	時間： 30分	全量100mLに調製 初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブ BS注	5mg/kg	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										
3	CVポート	時間： 15分			デキサート 注射液6.6mg	1瓶	○									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
4	CVポート	時間： 2時間			レボリナート 注	200mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
5	CVポート	時間： 10分	全開で	●	フルオウラシル 注	400mg/m ²	○									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
6	CVポート	時間： 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル 注	2400mg/m ²	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										