

化学療法レジメン

レジメン名 【血】オビヌツズマブ+アカラブルチニブ(2クール目)

上限：1クール

レジメンの概要 CD20陽性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）

投与量設定(点滴) ガザイバ(オビヌツズマブ) 100mg/body(day1)900mg/body(day2)1000mg/body(day8,15)

投与量設定(内服) カケンス(アカラブルチニブ) 200mg/day 1日2回(day1-28)、加ナール(アヒトアミノフィン) 500mg(day1,2,8,15)、

診療科名 血液 ホーラムミン(d-クロルフェニミン塩酸塩) 2mg/day(day1,2,8,15)

管理コード 200160 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 28
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カケンス内服 (ガザイバ投与60分前までに)★ ★加ナール,ホーラムミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○		○		○		
2	点滴静注	時間：30分	★ガザイバ投与60分前までに投与完了★		リル・ホーラムミン静注用40m g 生理食塩液PL「フー」 50mL	2瓶 1瓶	○	○		○		○		
3	点滴静注	時間：1時間			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○		○		○		
4	点滴静注	時間：4時間	★リル・ホーラムミン投与完了より60分空ける★ 25mL/hで投与 全量100mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液（希釈用）	100mg/body 1袋	○							
5	点滴静注	時間：4時間10分	★リル・ホーラムミン投与完了より60分空ける★ 13mL/hで開始 30分毎に13mL/hずつ増量可 ※最大111mL/hまで 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液（希釈用）	900mg/body 1袋		○						
6	点滴静注	時間：3時間15分	★リル・ホーラムミン投与完了より60分空ける★ 25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液（希釈用）	1000mg/body 1袋				○		○		
	内服	時間：_____		●	カケンス	200mg/day	○	...	...	...	...	...	...	○
	内服	時間：_____			加ナール ホーラムミン	500mg/day 2mg/day	○	○		○		○		

1クール目：カケンス(アカラブルチニブ)のみ
(28日間連日投与)
2クール目よりレジメン適応可能