

化学療法レジメン

レジメン名 【血】リツキシマブ+CHOP

上限：8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

投与量設定(点滴) リツキシマブ 375mg/m²(day1)、オキシリブチン(ヒンクリスチン) 1.4mg/m²(day1)、ドキシルビシン 50mg/m²(day1)、インドキサノ(シクロホスファミド) 750mg/m²(day1)

診療科名 血液

投与量設定(内服) プレドニソン(プレドニゾン) 60mg/m²(day2-6)、加ナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1)、ホウラミン(d-グルフェニミン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200005

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day2	...	Day 6					
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★加ナール、ホウラミン内服 (リツキシマブ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	側管静注	時間：_____			リル・コステブ注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間：15分			パロセチドン点滴静注パッケ 0.75mg 50mL	1袋		○							
4	点滴静注	時間：_____	初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキシマブ BS注 生理食塩液 (希釈用)	375mg/m ² mL	○								
5	点滴静注	時間：30分	※最大1回2mg/body	●	オキシリブチン注 生理食塩液PL「フソ」 50mL	1.4mg/m ² 1瓶		○							
6	点滴静注	時間：30分	積算値チェック	●	ドキシルビシン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶		○							
7	点滴静注	時間：2時間		●	インドキサノ注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋		○							
	内服	時間：_____			加ナール ホウラミン	500mg/day 2mg/day	○								
	内服	時間：_____			プレドニソン	60mg/m ²		○	...	○					