

化学療法レジメン

レジメン名【消】ニボルマブ+イピリムマブ(大腸)

上限：4クール

レジメンの概要治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌

診療科名消化器

投与量設定オプジーボ(ニボルマブ) 240mg/body(day1)、ヤホイ(イピリムマブ) 1mg/kg(day1)

管理コード100206

インターバル日数21（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間：30分	全量60mLに調製 フィルターライン使用	●	オプジーボ注 生理食塩液（希釈用）	240mg/body 1瓶	○									
3	点滴静注	時間：30分			生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間：30分	全量30mLに調製 フィルターライン使用	●	ヤホイ注 生理食塩液（希釈用）	1mg/kg 1瓶	○									

4クール施行後
【消】ニボルマブ(4週)
(100201)へ移行