

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ESHAP

上限：4クール

レジメンの概要 再発・難治性悪性リンパ腫

投与量設定(点滴) シスプラチン 25mg/m²(day1-4)、イトホシド 40mg/m²(day1-4)、シタレン 2000mg/m²(day5)、リル・ホドール(メチルプレドニゾン) 500mg/body(day1-5)

診療科名 血液

投与量設定(点眼) day5起床時-day6就寝時、1日4回(6時,12時,18時,眠前)スロイト点眼を両眼に行う(副作用予防)

管理コード 200013

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6			
1	点滴静注 末梢メイン	時間：6時間	ルート①		大塚生食注(500mLソフトパック)	1袋	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00				
2	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ルート②		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○	○	○	○	○				
3	点滴静注	時間：30分	ルート②		バロレト点点滴静注パック 0.75mg 50mL	1袋	○ 9:15								
					アガリス点滴静注235mg	1瓶									
4	点滴静注	時間：15分	ルート②		リル・ホドール注500mg	1瓶	○ 9:45	○ 9:45	○ 9:45	○ 9:45	○ 9:45				
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
5	点滴静注 末梢側管	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ルート①		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○	○	○	○					
6	点滴静注 末梢側管	時間：24時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製 ルート①	●	シスプラチン注 大塚生食注(希釈用)	25mg/m ² 1袋	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	積算値チェック				
7	点滴静注	時間：2時間	ルート②		マンニトールS注射液300mL	1袋	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00					
8	点滴静注	時間：2時間	全量500mLに調製 ルート②	●	シタレン注高用量 生理食塩液(希釈用)	2000mg/m ² 1袋					○ 10:00				
9	点滴静注	時間：1時間	※イトホシド用量200mgを超える 場合は50倍希釈する ルート②	●	イトホシド注 大塚糖液5%(500mLソフトパック)	40mg/m ² 1袋	○ 12:00	○ 12:00	○ 12:00	○ 12:00					
10	点滴静注 末梢メイン	時間：6時間	ルート①		大塚生食注(500mLソフトパック)	1袋	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00				
11	点滴静注 末梢メイン	時間：6時間	ルート①		硫酸マグネシウム補正液(20mL) 大塚生食注(500mLソフトパック)	1管 1袋	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00					
12	点滴静注	時間：2時間	ルート②		マンニトールS注射液300mL	1袋	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00					
13	点滴静注 末梢メイン	時間：6時間	ルート①		大塚生食注(500mLソフトパック)	1袋	○ 3:00	○ 3:00	○ 3:00	○ 3:00					
	内服	時間：_____			スロイト点眼					○	○				