

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ゾルバツキシマブ+FOLFOX6(2クール目以降)

レジメンの概要 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

診療科名 消化器

管理コード 100007

投与量設定(点滴)

インターバル日数

ヒドイ(ゾルバツキシマブ) 400mg/m²、レボレチナート 200mg/m²(day1)、サリチン 85mg/m²(day1)、フルオウラシル 400mg/m²(bolus)(day1)、2400mg/m²(46hr)(day1-2)

14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間： _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					アカリ点静注235mg	1瓶										
					ホウラミン注5mg	2管										
					バロレト点静注バグ 0.75mg 50mL	1袋										
3	CVポート メイン	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	CVポート メイン	時間： _____	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 2.0mg/mLに希釈調製して使用 0-30分: 50mL/h 30-60分: 100mL/h 60分以降: 200mL/h 3クール目以降は医師指示を 参照し2時間で投与可	●	ヒドイ注	400mg/m ²	○									
					注射用水(100mL)	1瓶										
					生理食塩液 (希釈用)	mL										
5	CVポート メイン	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
6	CVポート 側管	時間： 2時間	サリチンと同時投与		レボレチナート注	200mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトバグ)	1袋										
7	CVポート メイン	時間： 2時間	レボレチナートと同時投与 全量250mLに調製	●	サリチン注	85mg/m ²	○									
					アトウ糖液5% (希釈用)	1袋										
8	CVポート メイン	時間： 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²	○									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
9	CVポート メイン	時間： 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²	○									
					生理食塩液 (希釈用)	1瓶										