

化学療法レジメン

レジメン名 【血】HD-Ara-C(ver.MPV)  
レジメンの概要 中枢神経系原発悪性リンパ腫

診療科名 血液  
投与量設定(注射) ｷｬﾌﾟｼﾞﾝ (ｼﾌﾗﾐﾝ) 3000mg/m<sup>2</sup>(day1-2)  
投与量設定(点眼) day1起床時-day3就寝時、1日4回(6時,12時,18時,眠前)ｽﾚﾌﾟﾄ 点眼を両眼に行う(ｷｬﾌﾟｼﾞﾝ 副作用予防)  
管理コード 200132  
インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間       | 用法・その他             | 癌 | 薬品名称                        | 用量/単位                 | Day 1 | Day 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 点滴静注    | 時間 : _____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用 |   | 大塚生食注(100mL瓶)               | 1瓶                    | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 点滴静注    | 時間 : 30分   |                    |   | ﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾐﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ0.75mg 50mL | 1袋                    | ○     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |            |                    |   | ｱｵｶﾘﾝ点滴静注235m g             | 1瓶                    | 10:30 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 点滴静注    | 時間 : 3時間   | 全量500mLに調製         | ● | ｼﾌﾗﾐﾝ注高用量                   | 3000mg/m <sup>2</sup> | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |            |                    |   | 生理食塩液 (希釈用)                 | 1袋                    | 11:00 | 11:00 |  |  |  |  |  |  |  |