

化学療法レジメン

レジメン名 【消】GEM+S-1

上限：2クール

レジメンの概要 膵癌

投与量設定(点滴) ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)

診療科名 消化器 投与量設定(内服) ティーエスワン(テガフル・ギメシル・オテシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day15朝

管理コード 100126 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 14				
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○						
2	点滴静注	時間：15分			デキサト注射液6.6mg	0.5瓶	○		○						
					生理食塩液PL「フソ」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間：30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○		○						
					大塚生食注(100mL瓶)	1袋									
	内服	時間：_____		●	ティーエスワン	80-120mg/day	○	...	...	...	○				

【ティーエスワン】 地方独立行政法人 新小山市民病院

C法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。

これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回