

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ベバシズマブ+CapeIRI
レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

診療科名 消化器
管理コード 100038
投与量設定(点滴) ベバシズマブ 7.5mg/kg(day1)、イリナカン 200mg/m²(day1)
投与量設定(内服) ゼロータ (カプシリン) 800mg/m²/回 1日2回(day1-14) ※ゼロータ：通常、day1夕～day15朝
インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14						
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分	全量100mLに調製 初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブ BS注	7.5mg/kg	○								
					生理食塩液（希釈用）	1袋									
3	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
4	点滴静注	時間： 1時間30分		●	イリナカン注	200mg/m ²	○								
					ブドウ糖液5%(250mL)	1袋									
	内服	時間： _____		●	ゼロータ	800mg/m ² /回	○	...	○						
						1日2回									

地方独立行政法人 新小山市市民病院

【ゼロータ】

E法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1回用量
1.31m ² 未満	900mg
1.31m ² 以上1.69m ² 未満	1,200mg
1.69m ² 以上2.07m ² 未満	1,500mg
2.07m ² 以上	1,800mg