

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ブレンツキシマブ ベドチン+AVD

上限：6クール

レジメンの概要 未治療のCD30陽性のホジキンリンパ腫

投与量設定(点滴) トキリビシ 25mg/m²(day1,15)、イクザール(ヒソナラフィン) 6mg/m²(day1,15)、

ダカバジン 375mg/m²(day1,15)、アトセリス(ブレンツキシマブ ベドチン) 1.2mg/kg(day1,15)

診療科名 血液

投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1,15)、ホラミン(d-グルフェニラミン酸塩) 2mg/day(day1,15)

管理コード 200115

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 15							
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール、ホラミン内服 (アトセリス投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1袋	○		○							
2	点滴静注	時間：30分			リル・コテフ注射用100mg	1瓶	○		○							
					パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50mL	1袋										
					アカリ点点滴静注235mg	1瓶										
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○		○							
4	点滴静注	時間：30分	積算値チェック	●	トキリビシ注	25mg/m ²	○		○							
					生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶										
5	点滴静注	時間：15分	※最大1回10mg/body	●	イクザール注	6mg/m ²	○		○							
					生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶										
6	点滴静注	時間：2時間	注射用水の欄：total量を記載 溶解後濃度：10mg/mL 必要量を抜き取り希釈 点滴経路全般を遮光して投与	●	ダカバジン注	375mg/m ²	○		○							
					注射用水(100mL)	1瓶										
					大塚生食注(250mL袋)	1袋										
7	点滴静注	時間：_____	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○		○							
8	点滴静注	時間：30分	1Vにつき注射用水10.5mLで溶解 注射用水の欄：total量を記載 溶解後濃度：5mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	アトセリス注	1.2mg/kg	○		○							
					注射用水(100mL)	1瓶										
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										
	内服	時間：_____			カナール	500mg/day	○		○							
					ホラミン	2mg/day										