

化学療法レジメン

レジメン名 【血】リツキシマブ+ベンダムスチン

上限：6クール

レジメンの概要 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫

投与量設定(点滴) ベンダムスチン 90mg/m²(day1,2)、リツキシマブ 375mg/m²(day1)

診療科名 血液

投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1)、ホアラミン(d-クルフェニミン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200020

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2								
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール,ホアラミン内服 (リツキシマブ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○								
2	点滴静注	時間：15分			リル・コーフ注射用100mg	1瓶	○									
					パロノセトロン点滴静注パッケ0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間：10分		●	ベンダムスチン注	90mg/m ²	○	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
4	点滴静注	時間：_____	初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキシマブ BS注	375mg/m ²	○									
					生理食塩液 (希釈用)	mL										
	内服	時間：_____			カナール	500mg/day	○									
					ホアラミン	2mg/day										

地方独立行政法人 新小山市市民病院