

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】《皮下》トラスツズマブ+ペルツズマブ+PTX(1クール目)

レジメンの概要 HER2陽性の乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 ファスゴ[®] IN(ペ[®] ルツズマブ[®] 1200mg/body、トラスツズマブ[®] 600mg/body)(day1)、パ[®] クリタセル 80mg/m²(day1,8,15)

管理コード 150066

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	皮下注射	時間 : _____	大腿部に皮下投与 前回の注射部位から2.5cm以上離すこと 本剤15mLを8分以上かけて投与 投与終了後30分の経過観察を行う	●	ファスゴ [®] 注IN	1瓶	○								
3	点滴静注	時間 : 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○	○	○						
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ホ [®] ラミン注5mg	2管									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
4	点滴静注	時間 : 1時間	フィルターライン使用	●	パ [®] クリタセル注	80mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									