

化学療法レジメン

レジメン名 【血】カルフィルゾミブ+DEX(1クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) カイ°ロリス(カルフィルゾミブ) 20mg/m²(day1),70mg/m²(day8,15)

診療科名 血液 投与量設定(内服) レテックス(デキサメタゾン) 40mg/body(day1,8,15,22)

管理コード 200027 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 22		
1	点滴静注	時間 : 2時間	★レテックス内服 (カイ°ロリス投与 1 時間前までに)★		大塚糖液5%(500mLリフトパック)	1袋	○		○		○				
2	側管静注	時間 : _____			リル・コ・テフ注射用100mg	1瓶	○		○		○				
3	点滴静注	時間 : 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:2mg/mL 必要量を抜き取り希釈 全量100mLに調製	●	カイ°ロリス注 注射用水(100mL) ブドウ糖液5% (希釈用)	20mg/m ² 1瓶 1瓶	○								
4	点滴静注	時間 : 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:2mg/mL 必要量を抜き取り希釈 全量100mLに調製	●	カイ°ロリス注 注射用水(100mL) ブドウ糖液5% (希釈用)	70mg/m ² 1瓶 1瓶			○		○				
	内服	時間 : _____			レテックス	40mg/body	○		○		○		○		

カイ°ロリス
体表面積上限 : 2.2m²