

# 化学療法レジメン

レジメン名 【呼】オシメルチニブ+PEM+CDDP

上限：4クール

レジメンの概要 EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌

投与量設定(注射)  $\text{ハ}^\circ\text{メトレセト}^\circ$  500mg/ $\text{m}^2$ (day1)、 $\text{シス}^\circ\text{ラチン}$  75mg/ $\text{m}^2$ (day1)

診療科名 呼吸器

投与量設定(内服)  $\text{タゲリツリ}$ ( $\text{オシメルチニブ}$ )80mg/day(day1-21)

管理コード 250061

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路       | 点滴時間      | 用法・その他                | 癌 | 薬品名称                                 | 用量/単位               | Day 1 | ... | Day 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|-----------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 点滴静注<br>末梢メイン | 時間：_____  | ルートkeep用<br>フラッシュ用    |   | 大塚生食注(100mL瓶)                        | 1瓶                  | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 点滴静注<br>末梢メイン | 時間：2時間    |                       |   | 硫酸マグネシウム補正液(20mL)                    | 0.5管                | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |               |           |                       |   | リルテム3A輸液(500mL)                      | 1袋                  | 10:00 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 点滴静注<br>末梢メイン | 時間：1時間30分 |                       |   | リルテム1輸液(500mL)                       | 1袋                  | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |               |           |                       |   |                                      |                     | 12:00 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 点滴静注<br>末梢側管  | 時間：30分    | Rp.3開始後、側管から          |   | デキサート注射液6.6mg                        | 1.5瓶                | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |               |           |                       |   | アカリソ点滴静注235mg                        | 1瓶                  | 12:00 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |               |           |                       |   | ハロメトレセト点滴静注0.75mg 50mL               | 1袋                  |       |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 点滴静注<br>末梢メイン | 時間：10分    | 全量100mLに調製            | ● | $\text{ハ}^\circ\text{メトレセト}^\circ$ 注 | 500mg/ $\text{m}^2$ | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |               |           |                       |   | 大塚生食注(100mL)                         | 1瓶                  | 13:30 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 点滴静注<br>末梢メイン | 時間：30分    |                       |   | マンニトールS注射液300mL                      | 1袋                  | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |               |           |                       |   |                                      |                     | 13:40 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 点滴静注<br>末梢メイン | 時間：2時間    | 不要分を抜いて<br>合計600mLに調製 | ● | $\text{シス}^\circ\text{ラチン}$ 注        | 75mg/ $\text{m}^2$  | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |               |           |                       |   | 大塚生食注(希釈用)                           | 1袋                  | 14:10 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | 点滴静注<br>末梢メイン | 時間：2時間    |                       |   | リルテム3A輸液(500mL)                      | 1袋                  | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |               |           |                       |   |                                      |                     | 16:10 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | 点滴静注<br>末梢メイン | 時間：2時間    |                       |   | リルテム1輸液(500mL)                       | 1袋                  | ○     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |               |           |                       |   |                                      |                     | 18:10 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 内服            | 時間：_____  |                       | ● | $\text{タゲリツリ}$                       | 80mg/day            | ○     | ... | ○      |  |  |  |  |  |  |  |

積算値チェック