

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】《点滴》トラスツズマブ+ペルツズマブ+PTX(1クール目)

レジメンの概要 HER2陽性の乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 トラスツズマブ 8mg/kg(day1)、パニツェタ(ペルツズマブ) 840mg/body(day1)、パクリタセル 80mg/m²(day1,8,15)

管理コード 150068

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間 : <u>1時間30分</u>	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	8mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
3	点滴静注	時間 : <u>1時間</u>		●	パニツェタ注	840mg	○								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
4	点滴静注	時間 : <u>15分</u>			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○	○	○						
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ホウラミン注5mg	2管									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
5	点滴静注	時間 : <u>1時間</u>	フィルターライン使用	●	パクリタセル注	80mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									

地方独立行政法人 新小山市民病院