

化学療法レジメン

レジメン名【消】IRIS

レジメンの概要結腸・直腸癌(手術不能又は再発)

投与量設定(点滴)イリナカン 125mg/m²(day1,15)

診療科名消化器投与量設定(内服)ティーエスワン(テガフル・ギメシル・オラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day15朝

管理コード100045インターバル日数28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14	Day 15					
1	点滴静脈	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○			○					
2	点滴静脈	時間： 15分			デキスト注射液6.6mg	1瓶	○			○					
					パロピトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静脈	時間： 1時間30分		●	イリナカン注	125mg/m ²	○			○					
					大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	1袋									
	内服	時間： _____		●	ティーエスワン	80-120mg/day	○	...	○						

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ティーエスワン】

D法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後14日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回