

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ+VRD(2-12クール目)

レジメンの概要 多発性骨髄腫に対する導入、救援療法

投与量設定(点滴) サークリサ(イサツキシマブ) 10mg/kg(day1,15)、ホルテゾミブ 1.3mg/m²(day1,8,15)

投与量設定(内服) レバラミド(レリトミド) 5-25mg/day(day1-21)、レデックス(デキサメタゾン) 20mg/day(day1,8,15,22)、

加ナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1,15)、ホララミン(d-カルボエニラミン酸塩) 2mg/day(day1,15)

診療科名 血液

管理コード 200207

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 21	Day 22	
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★レデックス、加ナール、ホララミン内服 (サークリサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○				○				
2	点滴静注	時間 : 1時間15分	全量250mLに調製 フィルターライン使用 200mL/h	●	サークリサ注 生理食塩液 (希釈用)	10mg/kg 1袋	○				○				
3	皮下注射	時間 : _____	1Vにつき生食1.2mLで 溶解(残破棄) 生食の欄:total量を記載	●	ホルテゾミブ注 生食液NS 20mL	1.3mg/m ² 1管	○		○		○				
	内服	時間 : _____		●	レバラミド	5-25mg/day	○	...	...	...	...	...	○		
	内服	時間 : _____			レデックス	20mg/day	○		○		○			○	
	内服	時間 : _____			加ナール ホララミン	500mg/day 2mg/day	○				○				

地方独立行政法人 新小山市民病院