

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ(1クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) サークリサ(イサツキシマブ) 20mg/kg(day1,8,15,22)

診療科名 血液

投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500mg(day1,8,15,22),ホ°ラミン(d-グルフェニラミン塩) 2mg(day1,8,15,22)

管理コード 200204

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 22		
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★カナール,ホ°ラミン内服 (サークリサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○		○		○		
2	側管静注	時間 : _____	サークリサ投与30分前		リル・コ・テフ注射用100mg	1瓶	○		○		○		○		
3	点滴静注	時間 : _____	全量500mLに調製 フィルターライン使用	●	サークリサ注	20mg/kg									
		時間 : <u>5時間</u>	0-60分 : 25mL/h 60分以降 : 30分ごとに25mL/hずつ増量可 ※最大150mL/hまで		生理食塩液 (希釈用)	1袋	○								
		時間 : <u>3時間8分</u>	0-30分 : 50mL/h 30-60分 : 100mL/h 60分以降 : 200mL/h						○						
		時間 : <u>2時間30分</u>	200mL/hで投与								○		○		
	内服	時間 : _____			カナール	500mg/day	○		○		○		○		
					ホ°ラミン	2mg/day									

地方独立行政法人 新小山市民病院