

化学療法レジメン

レジメン名 【血】《要併用》オビヌツズマブ

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫※必ずCHOP[200000]もしくはベンダムスチン[200015]との併用で使用する。こと。

投与量設定(点滴) ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1)

投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1)、ホアラミン(d-カルルフェニルアラニン酸塩) 2mg/day(day1)

診療科名 血液

管理コード 200155

インターバル日数 7 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

他レジメンと併用できるよう設定しています。

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1										
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール,ホアラミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	必ずCHOP[200000]もしくはベンダムスチン [200015]との併用で使用する。こと。 単レジメンでの適応無し。									
2	点滴静注	時間 : 30分	★ガザイバ投与60分前までに投与完了★ 初回-3回目まで投与 4回目以降は投与無し		リル・メドロール静注用40mg 生理食塩液PL「フー」 50mL	2瓶 1瓶	○										
3	点滴静注	時間 : 1時間	初回-3回目まで投与 4回目以降は投与無し		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○										
4	点滴静注	時間 : 4時間20分 ※初回 時間 : 3時間15分 ※2-3回目 時間 : 2時間20分 ※4回目以降	★リル・メドロール投与完了より60分空ける★ 初回:12mL/hで開始 30分毎に12mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで 2-3回目:25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで 4回目以降 : 0-30分 : 25mL/h 30-60分 : 75mL/h 60分以降 : 150mL/h 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液 (希釈用)	1000mg/body 1袋	○										
	内服	時間 : _____			カナール ホアラミン	500mg/day 2mg/day	○										