

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ニボルマブ+CapeOX

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

投与量設定(点滴) 10⁰シ⁰-ホ⁰(ニホ⁰ルマ⁰) 360mg/body(day1)、オキサ⁰リ⁰チ⁰ン 130mg/m²(day1)

診療科名 消化器

投与量設定(内服) セ「 α -タ」(カ $^{\circ}$ シタ β ン) 1000mg/m²/回 1日2回(day1-14)

※セロータ：通常、day1夕～day15朝

管理コード	100202
-------	--------

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14						
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間：30分	全量60mLに調製 フィルターライン使用	●	ワゾーホ注	360mg/body	○								
					生理食塩液（希釈用）	1瓶									
3	点滴静注	時間：15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					グラセトン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋									
4	点滴静注	時間：2時間	全量500mLに調製	●	林ザラフィン注	130mg/m ²	○								
					ブドウ糖液5%（希釈用）	1袋									
	内服	時間：_____		●	ゼローダ	1000mg/m ² /回 1日2回	○	...	○						

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ゼローダ】

C法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。

これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1回用量
1.36㎡未満	1,200mg
1.36㎡以上1.66㎡未満	1,500mg
1.66㎡以上1.96㎡未満	1,800mg
1.96㎡以上	2,100mg