

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】ペムブロリズマブ+PTX+CBDCA

上限：4クール

レジメンの概要 ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前薬物療法

診療科名 乳腺
管理コード 150220

投与量設定 キイトルダ(ペムブロリズマブ) 200mg/body(day1)、パクリタセル 80mg/m²(day1,8,15)、カルボプラチン AUC=1.5,投与量=AUC×(25+GFR) (day1,8,15)
インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15					
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○					
2	点滴静注	時間：30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ注	200mg/body	○	4クール施行後 ペムブロリズマブ/DXR/CPA(150230)へ移行						
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○							
4	点滴静注	時間：15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○	○	○					
					ファモチジン注射用20mg	1管								
					ホーラミン注5mg	2管								
					グラセト点静注パック 1mg/50mL	1袋								
5	点滴静注	時間：1時間	フィルターライン使用	●	パクリタセル注	80mg/m ²	○	○	○					
					大塚生食注(250mL袋)	1袋								
6	点滴静注	時間：1時間		●	カルボプラチン注	AUC=1.5	○	○	○					
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋								