

化学療法レジメン

レジメン名 【血】DA-EPOCH(Level-2)

上限：8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

投与量設定 イト®シト 50mg/m²(day1-4),オコビ®ン(ビシクリスチン) 0.4mg/m²(day1-4),ドキリル®シシ 10mg/m²(day1-4),

診療科名 血液

イント®キサン(シクロホスファミド) 480mg/m²(day5),プレト®コ®ン 60mg/m²/回 1日2回(day1-5)p.o

管理コード 200100

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6			
1	点滴静注 末梢メイン	時間：24時間	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(1000mLリフトバ®ック)	1袋	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00				
2	点滴静注 末梢側管	時間：30分	側管上部		グラセト®点滴静注バ®ック 1mg/50mL	1袋	○ 9:00								
					アコリス点滴静注235m g	1瓶									
3	点滴静注 末梢側管	時間：30分	側管上部		グラセト®点滴静注バ®ック 1mg/50mL	1袋		○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00					
4	点滴静注 末梢側管	時間：30分	側管上部		バ®ロセト®点滴静注バ®ック 0.75mg 50mL	1袋					○ 9:00				
5	点滴静注 末梢側管	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 側管下部		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○	○	○	○	○				
6	点滴静注 末梢側管	時間：24時間	側管下部 ※イトボシド用量200mgを超える 場合は50倍希釈する	●	オコビ®ン注	0.4mg/m ²	○	○	○	○	積算値チェック				
				●	ドキリル®シシ注	10mg/m ²	10:00	10:00	10:00	10:00					
				●	イト®シト注	50mg/m ²									
					大塚生食注(500mLリフトバ®ック)	1袋									
7	点滴静注 末梢側管	時間：3時間	側管下部	●	イント®キサン注	480mg/m ²					○ 10:00				
					大塚生食注(250mL袋)	1瓶									
8	点滴静注 末梢側管	時間：30分	側管上部		グラセト®点滴静注バ®ック 1mg/50mL	1袋	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00					
9	皮下注射	時間：_____	エンドキサン注終了後 24時間以上経過してから投与		ジーラスタ皮下注	1筒						○			