

化学療法レジメン

レジメン名		【乳】《点滴》トラスツズマブ+ペルツズマブ+DTX(2クール目以降)										
レジメンの概要		乳癌										
診療科名	乳腺	投与量設定	トラスツズマブ 6mg/kg(day1)、パージェタ(ペルツズマブ) 420mg/body(day1)、ドセタセル 75mg/m ² (day1)									
管理コード	150075	インターバル日数	21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)									

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間 : 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	6mg/kg	○									
					注射用水(100mL)	1瓶										
					大塚生食注(250mL袋)	1袋										
3	点滴静注	時間 : 30分		●	パージェタ注	420mg	○									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋										
4	点滴静注	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
5	点滴静注	時間 : 1時間		●	ドセタセル注	75mg/m ²	○									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋										