

化学療法レジメン

レジメン名【血】《点滴》AZA

レジメンの概要 骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病

投与量設定(点滴) アザシジン 75mg/m²(day1-7)

診療科名 血液 投与量設定(内服) カイトリル(グラシメトン) 2mg/day(day1-7)

管理コード 200060 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) ※インターバル日数は原則28日ですが休日等を考慮して21日で登録しております。

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7		
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○	○	○	○	○		
2	点滴静注	時間 : 10分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:10mg/mL 必要量を抜き取り希釈 調製から1時間以内に投与	●	アザシジン注(点滴静注用)	75mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○		
					注射用水PL「フー」(20mL)	1管									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
	内服	時間 : _____			カイトリル	2mg/day	○	○	○	○	○	○	○		

地方独立行政法人 新小山市民病院