

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ+Pd(2クール目以降)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) サークサ(イサツキシマブ) 10mg/kg(day1,15)

投与量設定(内服) ホﾟマリスト(ホﾟマリトミド) 4mg/day(day1-21)、レナデックス(デキサメタゾン) 20-40mg/day(day1,8,15,22)、

診療科名 血液

加ナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1,15)、ホﾟラミン(d-カルフェニラミンレイン酸塩) 2mg/day(day1,15)

管理コード 200201

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 21	Day 22
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★レナデックス、加ナール、ホﾟラミン内服 (サークサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○				○			
2	点滴静注	時間：1時間15分	全量250mLに調製 フィルターライン使用 200mL/h	●	サークサ注	10mg/kg	○				○			
					生理食塩液（希釈用）	1袋								
	内服	時間：_____		●	ホﾟマリスト	4mg/day	○	...	...	...	...	...	○	
	内服	時間：_____			レナデックス	20-40mg/day	○		○		○			○
	内服	時間：_____			加ナール	500mg/day	○				○			
					ホﾟラミン	2mg/day								