

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】オシメルチニブ+PEM+CBDCA

上限：4クール

レジメンの概要 EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌

投与量設定(注射) $\text{H}^{\circ}\text{M}\text{L}\text{C}\text{H}\text{T}^{\circ}$ 500mg/m²(day1)、加 $\text{L}^{\circ}\text{P}^{\circ}\text{L}\text{A}\text{C}\text{H}\text{N}$ $\text{AUC}=4\sim6$,投与量= $\text{AUC}\times(25+\text{GFR})(\text{day}1)$

診療科名 呼吸器

投与量設定(内服) タ $\text{G}^{\circ}\text{L}\text{I}\text{Y}\text{Y}$ (オシメルチニブ) 80mg/day(day1-21)

管理コード 250060

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 21							
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 30分			デキスト注射液6.6mg	1瓶	○									
					アカリ点静注235m g	1瓶										
					パロチン点静注バッグ0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間： 10分	全量100mLに調製	●	$\text{H}^{\circ}\text{M}\text{L}\text{C}\text{H}\text{T}^{\circ}$ 注	500mg/m ²	○									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										
4	点滴静注	時間： 1時間		●	加 $\text{L}^{\circ}\text{P}^{\circ}\text{L}\text{A}\text{C}\text{H}\text{N}$ 注	$\text{AUC}=4\sim6$	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
	内服	時間： _____		●	タ $\text{G}^{\circ}\text{L}\text{I}\text{Y}\text{Y}$	80mg/day	○	...	○							