

化学療法レジメン

レジメン名【乳】FEC

レジメンの概要乳癌

診療科名乳腺

投与量設定1t°ル°シ 100mg/m²(day1)、インド°キ°ン(シロホスファミド°) 500mg/m²(day1)、フルオウラシル 500mg/m²(day1)

管理コード150006

インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間 : 30分			デ°キ°ト注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					アホリス点滴静注235m g	1袋										
					バ°ロ°レト°ン点滴静注バ°ッ°0.75mg 50mL	1瓶										
3	点滴静注	時間 : 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間 : 10分	※生食50mL抜く 全開で	●	1t°ル°シ注	100mg/m ²	○	積算値チェック								
					大塚生食注(100mL瓶)	0.5瓶										
5	点滴静注	時間 : 30分		●	インド°キ°ン注	500mg/m ²	○									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										
6	点滴静注	時間 : 30分		●	フルオウラシル注	500mg/m ²	○									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										