

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ペムプロリズマブ+PEM

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫

診療科名 呼吸器

投与量設定 キイトルダ（ $\text{A}^\circ\text{M}^\circ\text{P}^\circ\text{R}^\circ\text{I}^\circ\text{Z}^\circ\text{M}^\circ\text{A}^\circ\text{B}$ ） 200mg/body(day1)、 $\text{A}^\circ\text{M}^\circ\text{P}^\circ\text{R}^\circ\text{I}^\circ\text{Z}^\circ\text{M}^\circ\text{A}^\circ\text{B}$ 500mg/ m^2 (day1)

管理コード 250201

インターバル日数 21 （Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ 注	200mg/body	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間： 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
4	点滴静注	時間： 10分	全量100mLに調製	●	$\text{A}^\circ\text{M}^\circ\text{P}^\circ\text{R}^\circ\text{I}^\circ\text{Z}^\circ\text{M}^\circ\text{A}^\circ\text{B}$ 注	500mg/ m^2	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									