

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】GEM+PTX

レジメンの概要 乳癌

診療科名 乳腺 投与量設定  $\text{パクリタセル } 80\text{mg}/\text{m}^2(\text{day1,8})$ 、 $\text{ゲムシタビン } 1000\text{mg}/\text{m}^2(\text{day1,8})$

管理コード 150100 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間       | 用法・その他                           | 癌 | 薬品名称            | 用量/単位                      | Day 1 | Day 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|------------|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 点滴静注    | 時間 : _____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用<br>フィルターライン使用 |   | 大塚生食注(100mL瓶)   | 1瓶                         | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 点滴静注    | 時間 : 30分   |                                  |   | デキサト注射液6.6mg    | 1瓶                         | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |            |                                  |   | ファモチジン注射用20mg   | 1管                         |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |            |                                  |   | ホパラミン注5mg       | 2管                         |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |            |                                  |   | 生理食塩液PL「フー」50mL | 1瓶                         |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 点滴静注    | 時間 : 1時間   | フィルターライン使用                       | ● | パクリタセル注         | $80\text{mg}/\text{m}^2$   | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |            |                                  |   | 大塚生食注(250mL袋)   | 1袋                         |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 点滴静注    | 時間 : 30分   |                                  | ● | ゲムシタビン注         | $1000\text{mg}/\text{m}^2$ | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |            |                                  |   | 大塚生食注(100mL瓶)   | 1瓶                         |       |       |  |  |  |  |  |  |  |