

化学療法レジメン

レジメン名 【消】トラスツズマブ+SOX(1クール目)
レジメンの概要 胃癌

診療科名 消化器
管理コード 100081
投与量設定(点滴) トラスツズマブ 8mg/kg(day1)、オキサリプラチン 100mg/m²(day1)
投与量設定(内服) ティーエスワン(テガフル・ギメラシル・オテラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day15朝
インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14							
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間：1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注	8mg/kg	○									
					注射用水(100mL)	1瓶										
					大塚生食注(250mL袋)	1袋										
3	点滴静注	時間：15分			デキサメタゾン注射液6.6mg	1瓶	○									
					ゲラニトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋										
4	点滴静注	時間：2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注(全量500mL用)	100mg/m ²	○									
					ブドウ糖液5% (希釈用)	1袋										
	内服	時間：_____		●	ティーエスワン	80-120mg/day	○	...	○							

地方独立行政法人 新小山市市民病院

【ティーエスワン】

C法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回