

化学療法レジメン

レジメン名 【血】MPV(1,3,5,(7)クール目)

レジメンの概要 中枢神経系原発悪性リンパ腫

投与量設定(点滴) ワルビン(ビソナチン) 1.4mg/m²(day1)、メトトレート(メトトレート) 3500mg/m²(day1)

投与量設定(内服) プロカルパジン 100mg/m²/day(day1-7)

72時間前からST合剤中止,ルーブ利尿薬・NSAIDsはMTX感度以下まで併用禁忌 胸腹水がある症例は投与注意,CREによる用量調節は必要無い

診療科名

血液

管理コード

200130

インターバル日数

14 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 0	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	
1	点滴静注 末梢側管	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶		○							
2	点滴静注 末梢メイン	時間：8時間			メロニ静注7% 大塚生食注(1000mLリフトパック)	2管 1袋		○ 9:00							
3	点滴静注 末梢側管	時間：30分			バロトロ点滴静注バグ0.75mg 50mL アロカリ点滴静注235mg	1袋 1瓶		○ 10:00							
4	点滴静注 末梢側管	時間：30分	※最大1回2mg/body	●	ワルビン注 生理食塩液PL「フー」 50mL	1.4mg/m ² 1瓶		○ 10:30							
5	点滴静注 末梢側管	時間：3時間	全量500mLに調製	●	メトトレート注 生理食塩液（希釈用）	3500mg/m ² 1袋		○ 11:00							
6	側管静注	時間：_____	メトトレートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと		ロコネリン注3mg	5管				○ 11:00 5管固定	○ 11:00	○ 11:00			
7	側管静注	時間：_____	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し		ダイエック注 大塚生食注(20mL)	0.5瓶 0.25管		○ 15:00							
8	点滴静注 末梢メイン	時間：8時間			メロニ静注7% 大塚生食注(1000mLリフトパック)	2管 1袋		○ 17:00							
9	側管静注	時間：_____	メトトレートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと		ロコネリン注3mg	5管				○ 17:00	○ 17:00				
10	点滴静注	時間：12時間			メロニ静注7% 大塚生食注(1000mLリフトパック)	2管 1袋	○ 21:00								
11	側管静注	時間：_____	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し		ダイエック注 大塚生食注(20mL)	0.5瓶 0.25管	○ 21:00	○ 21:00							
12	側管静注	時間：_____	メトトレート投与開始36時間後より開始		ロコネリン注3mg	17管			○ 23:00						
13	側管静注	時間：_____	メトトレートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと		ロコネリン注3mg	5管				○ 23:00	○ 23:00				
14	点滴静注 末梢メイン	時間：8時間			メロニ静注7% 大塚生食注(1000mLリフトパック)	2管 1袋		○ 1:00							
15	側管静注	時間：_____	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し		ダイエック注 大塚生食注(20mL)	0.5瓶 0.25管		○ 3:00							
16	側管静注	時間：_____	メトトレートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと		ロコネリン注3mg	5管			○ 5:00 5管固定	○ 5:00	○ 5:00				
	内服	時間：_____			プロカルパジン	100mg/m ² /day		○	○	○	○	○	○	○	