

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】ダトポタマブ デルクステカン

レジメンの概要 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

投与量設定(注射) ダトロウエイ(ダトポタマブ デルクステカン) 6mg/kg(day1)

診療科名 乳腺 投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500-1000mg(day1)

管理コード 150150 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★カナール内服 (ダトロウエイ投与30分前までに)★		ブドウ糖液5%(100mL)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間 : 30分			デキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					アトリス点滴静注235mg	1瓶										
					ホウラミン注5mg	2管										
					パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間 : 10分	フラッシュ用		ブドウ糖液5%(100mL)	1瓶	○									
4	点滴静注	時間 : 30分	1Vにつき注射用水5mLで溶解 必要量を抜き取り希釈 注射用水の欄:total量を記載 ※初回は1時間30分 点滴パックを遮光 フィルターライン使用	●	ダトロウエイ注	6mg/kg	○									
					注射用水(100mL)	1瓶										
					ブドウ糖液5%(100mL)	1瓶										