

化学療法レジメン

|           |                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レジメン名     | 【血】エプコリタマブ(2-3クール目)                                                                                                                                       |                                                                                                  |
| レジメンの概要   | 再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫,高悪性度B細胞リンパ腫,原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫),<br>再発又は難治性の濾胞性リンパ腫                                                                     |                                                                                                  |
| 投与量設定（注射） | I <sup>o</sup> キリ(I <sup>o</sup> コリタマブ)48mg/body(day1,8,15,22)<br>※前回投与時にGrade2又は3のサイトカイン放出症候群が現れた場合のみデキサート(デキサメタゾン) 16.5mg/body(day1-4,8-11,15-18,22-25) |                                                                                                  |
| 診療科名      | 血液                                                                                                                                                        | 投与量設定（内服）                                                                                        |
| 管理コード     | 200171                                                                                                                                                    | インターバル日数                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                           | 加ナール(アトアミノフェン) 650-1000mg(day1,8,15,22)、ホ <sup>o</sup> ラミン(d-グルフェニラミドレイン酸塩)2mg/day(day1,8,15,22) |
|           |                                                                                                                                                           | 28（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）                                                                       |

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間     | 用法・その他                                                                                | 癌 | 薬品名称                             | 用量/単位                     | Day 1 | Day 2-4 | ... | Day 8 | Day 9-11 | ... | Day 15 | Day 16-18 | ... | Day22 | Day23-25 |
|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------|---------|-----|-------|----------|-----|--------|-----------|-----|-------|----------|
| 1  | 点滴静注    | 時間：_____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用<br>★加ナール,ホ <sup>o</sup> ラミン内服<br>(I <sup>o</sup> キリ投与30-120分前までに)★ |   | 大塚生食注(100mL瓶)                    | 1瓶                        | ○     | ○       |     | ○     | ○        |     | ○      | ○         |     | ○     | ○        |
| 2  | 点滴静注    | 時間：15分   |                                                                                       |   | デキサート注射液6.6mg<br>生理食塩液PL「フー」50mL | 2.5瓶<br>1瓶                | ○     | ○       |     | ○     | ○        |     | ○      | ○         |     | ○     | ○        |
| 3  | 点滴静注    | 時間：30分   |                                                                                       |   | 大塚生食注(100mL瓶)                    | 1瓶                        | ○     |         |     | ○     |          |     | ○      |           |     | ○     |          |
| 4  | 皮下注射    | 時間：_____ | ★加ナール,ホ <sup>o</sup> ラミン内服<br>(I <sup>o</sup> キリ投与30-120分前までに)★                       | ● | I <sup>o</sup> キリ注               | 48mg/body                 | ○     |         |     | ○     |          |     | ○      |           |     | ○     |          |
|    | 内服      | 時間：_____ |                                                                                       |   | 加ナール<br>ホ <sup>o</sup> ラミン       | 650-1000mg/day<br>2mg/day | ○     |         |     | ○     |          |     | ○      |           |     | ○     |          |

地方独立行政法人 新小山市市民病院

前回投与時にGrade2又は3のサイトカイン放出症候群が  
現れなかった場合はRp1-3は削除、Rp4のみ投与する。  
※ホ<sup>o</sup>ラミン、加ナールは毎回投与する。