

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ+VRD(19クール目以降)

レジメンの概要 多発性骨髄腫に対する導入、救援療法

投与量設定(点滴) サークリサ(イサツキシマブ) 10mg/kg(day1)

診療科名 血液 投与量設定(内服) レバラミド(レナリドミド) 5-25mg/day(day1-21)、カロナール(アセトアミノフェン) 500mg/day(day1)、ホﾟラミン(d-カルノエラミン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200209 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 21						
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★カロナール,ホﾟラミン内服 (サークリサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	側管静注	時間 : _____	サークリサ投与30分前		リル・コテフ注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間 : <u>1時間15分</u>	全量250mLに調製 フィルターライン使用 200mL/h	●	サークリサ注	10mg/kg	○								
					生理食塩液 (希釈用)	1袋									
	内服	時間 : _____		●	レバラミド	5-25mg/day	○	...	○						
	内服	時間 : _____			カロナール	500mg/day	○								
					ホﾟラミン	2mg/day									