

化学療法レジメン

レジメン名【血】モガムリズマブ

上限：8クール

レジメンの概要

CCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫、再発又は難治性のCCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫

投与量設定(点滴)

ホ®テリジ®オ(モガムリズマブ) 1mg/kg(day1)

診療科名血液

投与量設定(内服)

加ナール(アトアミノフェン) 500mg/day(day1)、ホ®ラミン(d-クロルフェニラミンレイン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード200221

インターバル日数7

(Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

他レジメンと併用できるよう設定しています。

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間     | 用法・その他                                                     | 癌 | 薬品名称            | 用量/単位     | Day 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|----------|------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 点滴静注    | 時間：_____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用<br>★加ナール,ホ®ラミン内服<br>(ホ®テリジ®オ投与30分前までに)★ |   | 大塚生食注(100mL瓶)   | 1瓶        | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 側管静注    | 時間：_____ | ホ®テリジ®オ投与30分前までに投与                                         |   | ソル・コ・テフ注射用100mg | 1瓶        | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 点滴静注    | 時間：2時間   |                                                            | ● | ホ®テリジ®オ注        | 1mg/kg    | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |          |                                                            |   | 大塚生食注(250mL袋)   | 1瓶        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 内服      | 時間：_____ |                                                            |   | 加ナール            | 500mg/day | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |          |                                                            |   | ホ®ラミン           | 2mg/day   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |