

化学療法レジメン

レジメン名 **【血】モガムリズマブ+CHOP**

上限：8クール

レジメンの概要 CCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫

投与量設定(点滴) ホﾟテリジオ(モガムリズマブ) 1mg/kg(day1)、オコビン(ビンクリスチン) 1.4mg/m²(day2)、ドキルビジン 50mg/m²(day2)、インドキサン(シクロホスファミド) 750mg/m²(day2)

診療科名 血液 投与量設定(内服) プレドニソン(プレドニゾロン) 60mg/m²(day2-6)、加ナール(アセトミノフェン) 500mg/day(day1)、ホﾟラミン(d-グルタミン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200220 インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day2	...	Day 6					
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★加ナール,ホﾟラミン内服 (ホﾟテリジオ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	側管静注	時間：_____	ホﾟテリジオ投与30分前までに投与		リル・コ・テフ注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間：15分			パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋		○							
4	点滴静注	時間：2時間		●	ホﾟテリジオ注 大塚生食注(250mL袋)	1mg/kg 1瓶	○								
5	点滴静注	時間：30分	※最大1回2mg/body	●	オコビン注 生理食塩液PL「フー」 50mL	1.4mg/m ² 1瓶		○							
6	点滴静注	時間：30分	積算値チェック	●	ドキルビジン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶		○							
7	点滴静注	時間：2時間		●	インドキサン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋		○							
	内服	時間：_____			加ナール ホﾟラミン	500mg/day 2mg/day	○								
	内服	時間：_____			プレドニソン	60mg/m ²		○	...	○					