

化学療法レジメン

レジメン名 【血】デニロイキン ジフチトクス

上限：8クール

レジメンの概要 再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫、再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫

投与量設定(注射) レミド(デニロイキン ジフチトクス) 9μg/kg(day1-5)

診療科名 血液

投与量設定(点滴) カナール(アモキシシリン) 500mg/day(day1-5)、ホ®ラミン(d-グルタミン酸塩) 2mg/day(day1-5)

管理コード 200190

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) ※投与前に眼科受診、投与日のAlb:3.0g/dL未満を確認

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5				
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール,ホ®ラミン内服 (レミド投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○	○	○				
2	点滴静注	時間：30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○								
					パ®レトロン点滴静注パ®ッグ0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間：30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶		○	○	○	○				
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
4	点滴静注	時間：60分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:150μg/mL 必要量を抜き取り希釈 フィルター不可	●	レミド注	9μg/kg	○	○	○	○	○				
					注射用水PL「フー」(20mL)	1管									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1袋									